



DR. MED. JIHAN MOHASSEB
Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Plastisch-Ästhetische Operationen

Fraxel® Verfahren

Aufklärung zur Behandlung mit Fraxel® DUAL 1550/1927

Einverständniserklärung für Patienten Laserbehandlung mit Fraxel® DUAL 1550/1927

Hinweis: Unterschreiben Sie dieses Formular nur, wenn Sie es vollständig gelesen und verstanden haben.

Die Behandlung mit Fraxel DUAL 1550/1927 wurde mir hinreichend erläutert. Ich kenne die Vorteile des Verfahrens und weiß, dass jede Behandlung in gewissem Umfang Risiken birgt. Mir ist bekannt, dass die nachstehend aufgeführten Nebenwirkungen zu den zu erwartenden Nebenwirkungen der Behandlung mit Fraxel DUAL 1550/1927 zählen:

- **Beschwerden:** Die meisten Menschen empfinden leichte, hitzebedingte Beschwerde (Schmerzen). Diese Beschwerden treten für gewöhnlich nur vorübergehend während des Verfahrens und nur im Behandlungsareal auf. Eine geringe Anzahl an Patienten berichtete von Druckschmerzen im Behandlungsareal, die bis zu mehreren Wochen anhielten.
- **Rötung und Schwellung:** Die Laserbehandlung verursacht unterschiedlich starke Rötungen und Schwellungen im Behandlungsareal. Diese häufig auftretenden Nebenwirkungen halten je nach Aggressivität der Behandlung zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen an.
- **Juckreiz:** Juckreiz kann im Rahmen der normalen Wundheilung oder bei Infektion, schlechter Wundheilung oder Kontaktekzem auftreten.
- **Akne oder Milienbildung:** Gegebenenfalls tritt ein Akneschub oder die Bildung von Milien (winzige weiße Beulen oder kleine Zysten auf der Haut) auf. Diese Symptome klingen jedoch für gewöhnlich vollständig ab.
- **Herpes simplex – Reaktivierung:** In seltenen Fällen kann ein durch das Herpes-simplex-Virus bedingter Hautausschlag (Herpes) im behandelten Hautareal auftreten, sofern dieses schon zuvor mit dem Virus infiziert war.

Mir ist bekannt, dass die nachstehend aufgeführten Risiken und Komplikationen zu den möglichen Risiken oder Komplikationen bei einer Behandlung mit Fraxel DUAL 1550/1927 zählen:

- **Bluten, Nässen, Krustenbildung:** Eine aggressive Behandlung kann gegebenenfalls zu punktförmigen Blutungen, Petechien (= kleine rote Punkte unter der Hautoberfläche) und/oder Nässen führen. Wenn die klare Flüssigkeit oder das Blut trocknet, bilden sich gegebenenfalls Krusten oder Schorf.



DR. MED. JIHAN MOHASSEB
Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Plastisch-Ästhetische Operationen

Fraxel® Verfahren

Aufklärung zur Behandlung mit Fraxel® DUAL 1550/1927

- **Blasen, Verbrennungen, Schorfbildung:** Durch die Hitze in den oberen Hautschichten treten ggf. Blasen oder Verbrennungen und anschließende Schorfbildung auf. Der durch die Hitze entstehende Dampf kann dazu führen, dass obere und mittlere Hautschicht sich voneinander lösen und sich Blasen bilden. Diese Blasen verschwinden für gewöhnlich innerhalb von zwei bis vier Tagen. Nach einer Blase bildet sich üblicherweise Schorf, der aber im Rahmen der natürlichen Wundheilung der Haut verschwindet.
- **Vernarbung:** Durch die Beeinträchtigung der Hautoberfläche und/oder eine abnormale Wundheilung können sich Narben bilden. Narben können dauerhaft sowie erhaben oder flach sein. Im vernarbten Hautareal kann die Narbenbildung zu einer Unterpigmentierung (= verminderte Bildung von Hautpigmenten) führen.
- **Pigmentveränderungen:** Während der Wundheilung kann das behandelte Hautareal dunkler erscheinen. Dieses Phänomen wird als post-inflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) bezeichnet. Möglicherweise konnten Sie diese Hautreaktion in der Vergangenheit schon bei kleineren Schnitten oder Abschürfungen beobachten. Sie tritt im Rahmen der gewöhnlichen Reaktion der Haut auf Verletzungen auf. Während des Wundheilungsprozesses werden die Hautfunktionen hyperaktiv, so auch die pigmentproduzierenden Zellen. PIH tritt bei Personen mit dunkler Hautfarbe, nach direkter Sonneneinstrahlung auf dem behandelten Hautareal oder bei gebräunten Patienten häufiger auf. Zur Verringerung des Risikos von PIH schützen Sie die behandelten Hautareale vor Sonneneinstrahlung (Verwendung von Sonnencreme für bis zu sechs Monate nach Behandlung); bei einigen Patienten kann eine verstärkte Pigmentierung der Haut auch dann auftreten, wenn die behandelten Hautareale vor Sonneneinstrahlung geschützt wurden. Diese Pigmentierung verblasst für gewöhnlich nach drei bis sechs Monaten.
- **Unterpigmentierung:** Bei einigen Patienten, bei denen Veränderungen der Pigmentierung auftreten, tritt ggf. im behandelten Hautareal ein Pigmentverlust (Hypopigmentierung) auf, und das Behandlungsareal wird heller als die umliegende Haut. Diese Art der Hautreaktion kann auch dauerhaft sein.
- **Entzündung:** Bei Blasen oder Blutungen kann sich die Wunde entzünden. Auch Narbenbildung und damit verbundene Pigmentveränderungen können eine Folge von Entzündungen sein.



DR. MED. JIHAN MOHASSEB
Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Plastisch-Ästhetische Operationen

Fraxel® Verfahren

Aufklärung zur Behandlung mit Fraxel® DUAL 1550/1927

- **Augenverletzungen:** Augenverletzungen können dann auftreten, wenn Betäubungscreme in die Augen gelangt. Ihre Augen sind während des Verfahrens mit einer Schutzbrille bedeckt und sollten während der gesamten Behandlungsdauer geschlossen bleiben. Ohne diese Vorkehrungen besteht die Gefahr einer direkten Verletzung der Augen durch den Laser.
- **Wirksamkeit:** Jeder Mensch ist einzigartig. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, vorauszusagen, welche Personen von dem Verfahren profitieren. Bei manchen Patienten treten deutliche Verbesserungen ein, während bei anderen ggf. kaum eine oder gar keine Verbesserung beobachtet werden kann. Für ein optimales Ergebnis sind üblicherweise mehrere Sitzungen erforderlich.
- **Gegenanzeigen:** Die Behandlung mit Fraxel DUAL 1550/1927 darf nicht durchgeführt werden bei Patienten, die derzeit mit Accutane gegen Akne behandelt werden oder innerhalb der letzten sechs Monate damit behandelt wurden, bei Patienten, die zu Keloidbildung oder überschießender Narbenbildung neigen, sowie bei Patienten mit verdächtigen Läsionen.



DR. MED. JIHAN MOHASSEB
Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
und Plastisch-Ästhetische Operationen

Fraxel® Verfahren

Aufklärung zur Behandlung mit Fraxel®

DUAL 1550/1927

Ich bin mir bewusst, dass andere unerwartete Risiken oder Komplikationen auftreten können und dass mir keine Garantien oder Versprechen in Bezug auf das Behandlungsergebnis gegeben wurden. Mir wurde darüber hinaus erläutert, dass während der vorgeschlagenen Behandlung unvorhergesehene Nebenwirkungen auftreten können, die gegebenenfalls die Durchführung zusätzlicher Verfahren erforderlich machen. Meine Fragen zu dieser Behandlung, zu den Alternativen, Komplikationen und Risiken wurden von meinem Arzt / meiner Ärztin bzw. seinen / ihren Mitarbeitern hinreichend beantwortet.

UNTERSCHREIBEN SIE DIESES FORMULAR NUR, WENN SIE ES GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. BITTE STELLEN SIE ALLE IHRE FRAGEN VOR DER UNTERZEICHNUNG DIESES FORMULARS. UNTERSCHREIBEN SIE DIESES FORMULAR NICHT, WENN SIE ARZNEIMITTEL EINNEHMEN, DIE IHRE GEISTIGEN FÄHIGKEITEN BEEINTRÄCHTIGEN, ODER WENN SIE SICH BEDRÄNGT ODER UNTER DRUCK GESETZT FÜHLEN.

Ich habe dieses Formular gelesen und verstanden, und ich wünsche eine Behandlung mit dem Verfahren.

Unterschrift des Patienten/der Patientin:

Datum:

Ich habe den Patienten/die Patientin über die verfügbaren Behandlungsalternativen sowie über mögliche Risiken und Komplikationen infolge dieser Behandlung aufgeklärt.

Unterschrift des Arztes/der Ärztin:

Datum:

Unterschrift Krankenpflegekraft oder Medizinische(r) Assistent(in) :

Datum: